

CHERCHONS LA PETITE BÊTE...



ETUDE DE CONFORMITÉ DES NOTICES DE PRÉPARATIONS DESTINÉES A LA PÉDICULOSE DU CUIR CHEVELU.

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES POUR UNE UTILISATION CORRECTE D'APRÈS LA LITTÉRATURE.

- (1) – Examiner toute chevelure en cas de démangeaisons persistantes.
- (2) – Il n'existe aucun produit préventif. Ne traiter que si la présence de poux vivants et/ou de lentes vivantes a été détectée et examiner toute personne ayant été en contact.
- (3) – Un traitement correspond à 2 applications à 7 ou 10 jours d'intervalle.
- (4) – Un temps d'application suffisant doit être respecté (et une quantité de produit utilisé suffisante).
- (5) – Éviter le contact avec les yeux et les muqueuses.
- (6) – En cas d'échec d'un traitement complet, changer de produit (pyréthroïdes → malathion ou inversement).
- (7) – Emploi complémentaire d'un peigne spécifique muni éventuellement d'une gaze imbibée d'une solution vinaigrée.
- (8) – Pas de flacon pressurisé chez l'asthmatique et chez l'enfant de moins d'un an.
- (9) – Décontaminer les objets infestés par lavage à 60°, par insecticide ou par mise en sac clos pendant 15 jours.
- (10) – Pas de solution alcoolique en dessous de 2 ans.
- (11) – Pas de malathion en dessous de 2 ans et chez la femme enceinte.
- (12) – La présence de dérivé terpénique dans l'excipient contre-indique l'usage chez les nourrissons, les jeunes enfants et les sujets âgés.
- (13) – Les solutions alcooliques ou inflammables doivent être appliquées à l'écart de toute flamme.
- (14) – Pas de pyréthroïde en dessous de 6 mois (remplacé par peignages répétés (3 fois par jour) et prolongés (3 semaines)).
- (15) – L'utilisation d'associations malathion-pyréthroïdes est discutable: si une résistance à une substance est suspectée, il est préférable d'avoir la possibilité d'utiliser une autre substance.
- (16) – Ne pas couvrir la tête.
- (17) – Les solutions alcooliques de malathion doivent être conservées entre 8 et 15°C.

REFERENCES

1. LRP- Poux de tête : ne pas en faire une maladie 2001 ;21 (222):76 1.
2. FOLIA PHARMACOTHERAPEUTICA - Prise en charge des poux 1998;25(9):65.
3. FOLIA PHARMACOTHERAPEUTICA - Prise en charge des poux 1999;26(2):12.
3. MEDICAL LETTER 1990;12(2):7.

**TABLEAU CONFRONTANT LES RECOMMANDATIONS
AVEC LES DONNEES DES NOTICES**

| | Produits | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | PRIX |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|
| Médicaments enregistrés Malathion | PRIODERM Lotion alcoolique à 0,5% (+ terpinéol) | 0 | + | + | + | + | 0 | + | | 0 | 0 | - | 0 | + | | | + | + | 6,67 € |
| | RADIKAL Lotion alcoolique à 0,5% | 0 | - | 0 | + | + | 0 | + | | 0 | - | - | | + | | | + | + | 6,87 € |
| | NIX Crème «rinse» perméthrine 1% (+ peigne) | 0 | - | - | - | + | 0 | + | | 0 | | | | | + | | 0 | | 9,54 |
| | PARA Shamp. depalletrine 1,1% + piperonyl butoxide 4,4% | 0 | 0 | + | + | + | 0 | + | | 0 | | | | | 0 | | | | 7,81 |
| | PARA Spray depalletrine 0,56% + piperonyl butoxide 2,54% | 0 | - | - | + | + | 0 | + | + | + | | | | | + | + | | + | 8,80 |
| | QUELLADA Shamp. permethrine 1% (+peigne) | + | + | + | + | + | 0 | + | | + | | | | | + | | | | 9,42 |
| Produits non-enregistrés Pyrethroides | ITEM Shamp. d-phenotrine 0,4% | 0 | - | - | + | + | 0 | 0 | | + | | | | | 0 | | | | 6,49 |
| | ITEM Lotion-spray d-phenotrine 0,3% | 0 | + | - | + | + | 0 | + | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | 8,83 |
| | SHAMPOUX Lotion-spray permethrine 1% piperonyl butoxide 4% sol. alc. | 0 | + | + | + | + | 0 | + | - | + | 0 | | | 0 | + | | 0 | | 8,68 |
| | SHAMPOUX Shamp. permethrine 1% piperonyl butoxide 4% | 0 | + | + | + | + | 0 | + | | + | | | | | - | | | | 8,68 |
| | LK8+ Lotion-spray permethrine 1% sol. alc. (+ peigne) | 0 | - | - | - | + | 0 | - | | + | - | | | | + | - | | 0 | 9,10 |
| | LK8+ Shamp. permethrine 1% | 0 | - | + | - | + | 0 | + | | + | - | | | | + | | | | 7,56 |
| Enreg. M + P | PARA PLUS Lotion-spray malathion 0,5% permethrine 1% piperonyl butoxide 4% | 0 | + | 0 | - | + | | + | + | + | | - | | + | - | - | + | | 9,30 |

“+” = recommandation correcte “-” = recommandation incorrecte “o” recommandation inexistante “ ” = sans objet

Remarque : on trouve différents peignes à poux:

- en plastic (± 1 €); en corne (± 2,5 €); en métal (± 21 €)

- le plus efficace (dents suffisamment serrées et solides) est le Nisska ®, mais celui-ci coûte 21,23 €.

CONCLUSIONS : on peut noter:

- une grande disparité dans le contenu des notices;

- l'absence de consensus autour d'une tactique commune au point de vue:

-traitement

-prévention des épidémies

-lutte contre l'apparition de résistances (pas d'application préventive) (deuxième application après 7-10 jours) (pas d'application simultanée de produits différents)

- l'absence de contre-indication chez l'enfant de moins de 2 ans et chez la femme enceinte pour les solutions alcooliques de malathion.

Marc Delhaye, Pharmacien